


## 1>> NEO\*



ФАЗА:  
3–6 листків

NEO: 1–2,5 л /га



| Склад мікродобрива NEO |                               |                  |                 |       |             |              |       |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|--------------|-------|
| N                      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | SO <sub>3</sub> | *Fe   | B           | *Mn          | *Zn   |
| 50 г/л                 | 180 г/л                       | 90 г/л           | 5 г/л           | 3 г/л | 5 г/л       | 4 г/л        | 3 г/л |
| *Cu                    | *Mo                           | *Mg              | Гумат           | ПАР   | Фітогормони | Амінокислоти |       |
| 5 г/л                  | 1 г/л                         | 5 г/л            | 1 %             | 3 %   | 2 г/л       | 2 г/л        |       |

\* Елемент в хелатній формі EDTA

## 3>> ЦИНК



ФАЗА:  
8–10 листків

ЦИНК: 1–3 л/га  
+  
UNI: 1–3 л/га



| Склад мікродобрива Zink 100 |         |       |     |              |
|-----------------------------|---------|-------|-----|--------------|
| N                           | *Zn     | Гумат | ПАР | Амінокислоти |
| 80 г/л                      | 100 г/л | 2 %   | 3 % | 5 г/л        |

\* Елемент в хелатній формі EDTA

## 2>> СТИМУЛІН



ФАЗА:  
6–8 листків

СТИМУЛІН: 1–3 л /га  
+  
ЦИНК: 1–3 л/га



| Склад мікродобрива СТИМУЛІН |                               |                  |                 |       |             |              |       |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|--------------|-------|
| N                           | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | SO <sub>3</sub> | *Fe   | B           | *Mn          | *Zn   |
| 60 г/л                      | 90 г/л                        | 110 г/л          | 6 г/л           | 1 г/л | 1 г/л       | 1 г/л        | 1 г/л |
| *Cu                         | *Mo                           | *Mg              | Гумат           | ПАР   | Фітогормони | Амінокислоти |       |
| 1 г/л                       | 1 г/л                         | 3 г/л            | 4 %             | 3 %   | 2 г/л       | 4 г/л        |       |

\* Елемент в хелатній формі EDTA



\*NEO —  
обробка насіння  
1 л = 1 тонна

### УВАГА!

Для інтенсивного вирощування культури  
рекомендується комплекс амінокислот в період  
вегетації від 100 мл/га

## КУКУРУДЗА

