

1>> NEO*



ФАЗА:
2–3 трійчастих листки



NEO: 1–3 л /га
+ МОЛІБДЕН: 0,5 л/га

Склад мікродобрива NEO							
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	*Fe	B	*Mn	*Zn
50 г/л	180 г/л	90 г/л	5 г/л	3 г/л	5 г/л	4 г/л	3 г/л
*Cu	*Mo	*Mg	Гумат	ПАР	Фітогормони	Амінокислоти	
5 г/л	1 г/л	5 г/л	1 %	3 %	2 г/л	2 г/л	

* Елемент в хелатній формі EDTA

3>> UNI



ФАЗА: початок
формування бобів



СТИМУЛІН: 1–3 л /га

Склад мікродобрива СТИМУЛІН							
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	*Fe	B	*Mn	*Zn
60 г/л	90 г/л	110 г/л	6 г/л	1 г/л	1 г/л	1 г/л	1 г/л
*Cu	*Mo	*Mg	Гумат	ПАР	Фітогормони	Амінокислоти	
1 г/л	1 г/л	3 г/л	4 %	3 %	2 г/л	4 г/л	

* Елемент в хелатній формі EDTA

2>> + СТИМУЛІН БОР



ФАЗА:
бутонізація



СТИМУЛІН: 1–3 л /га
+ БОР: 1–3 л/га

Склад мікродобрива БОР					
N	B	Mo	Гумат	ПАР	Амінокислоти
80 г/л	150 г/л	3 г/л	2 %	3 %	5 г/л



*NEO —
обробка насіння
1 л = 1 тонна

УВАГА!

Для інтенсивного вирощування культури
рекомендується комплекс амінокислот в період
вегетації від 100 мл/га

СОЯ

