


1>> NEO*



ФАЗА:
3–6 листків



NEO: 1–2,5 л /га

Склад мікродобрива NEO							
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	*Fe	B	*Mn	*Zn
50 г/л	180 г/л	90 г/л	5 г/л	3 г/л	5 г/л	4 г/л	3 г/л
*Cu	*Mo	*Mg	Гумат	ПАР	Фітогормони	Амінокислоти	
5 г/л	1 г/л	5 г/л	1 %	3 %	2 г/л	2 г/л	

* Елемент в хелатній формі EDTA

3>> UNI



ФАЗА:
вихід в трубку



UNI: 1–3 л/га

Склад мікродобрива UNI							
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	*Fe	B	*Mn	*Zn
200 г/л	50 г/л	50 г/л	50 г/л	8 г/л	6 г/л	10 г/л	12 г/л
*Cu	*Mo	*Mg	Гумат	ПАР			
10 г/л	1 г/л	10 г/л	3 %	3 %			

* Елемент в хелатній формі EDTA

2>> СТИМУЛІН



ФАЗА:
кущення



+ СТИМУЛІН: 1–3 л /га
МІДЬ: 0,5–1 л/га

Склад мікродобрива СТИМУЛІН							
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	*Fe	B	*Mn	*Zn
60 г/л	90 г/л	110 г/л	6 г/л	1 г/л	1 г/л	1 г/л	1 г/л
*Cu	*Mo	*Mg	Гумат	ПАР	Фітогормони	Амінокислоти	
1 г/л	1 г/л	3 г/л	4 %	3 %	2 г/л	4 г/л	

* Елемент в хелатній формі EDTA



*NEO —
обробка насіння
1 л = 1 тонна

УВАГА!

Для інтенсивного вирощування культури
рекомендується комплекс амінокислот в період
вегетації від 100 мл/га

ЯРІ ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ

